



ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА ДЕНТИНОКС-Гель Н

Препаратнинг савдо номи: Дентинокс-гель Н

Дори шакли: гель

Таркиби:

1г препарат қуйидагиларни сақлайди:

фаол моддалар:

150.0 мг	мойчечак гуллари настойкаси (1:5);
3.4 мг	лидокаин гидрохлориди;
3.2 мг	макрогол лаурил эфири (полидоканол (600));

ёрдамчи моддалар: карбомер, натрий эдетати, левоментол, 10% ли натрий гидроксиди эритмаси, полисорбат 20, пропиленгликоль, натрий сахарини, суяқ кристалланмаган сорбитол, тозаланган сув, ксилит.

Таъриф: сариқ рангли, мойчечак ва ялпиз хидли, ва мойчечак ва ялпиз таъмли тиник гель.

Фармакотерапевтик гурухи: Овқат ҳазм қилиш йўллари ва моддалар алмашинуви. Стоматологик препаратлар. Оғиз бўшлиғи касалликларини маҳаллий даволаш учун препаратлар ва бошқалар. Бошқалар.

АТХ коди: A01AD11

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикаси

Дентинокс Гель Н препарати биринчи тишларни ва барча сут тишларини ёриб чиқишини қисқа вақтли енгиллаштириш учун препаратдир.

Оғиз бўшлиғида маҳаллий қўллаш учун гель (гидрогель) дан иборат. Шиллик қаватда биринчи кесувчи тишлар, сут тишлари ва кейинги илдизли тишларни оғриқсиз ва асоратсиз пайдо бўлишини таъминлайди.

Учта таркибий қисмларининг мажмуаси давомли фармакологик самарани таъминлайди. Лидокаин тезда оғриқсизлантирувчи, аммо қисқа муддатли самарани таъминлайди, у препарат милкка аппликациясидан кейин бир неча минутдан кейин кузатилади. Препаратнинг оғриқни қолдирувчи таъсирининг давомийлиги полидоканол 600 томонидан таъминланади.

Мойчечак настойкасининг ўртача яллиғланишга қарши таъсири маҳаллий яллиғланиш реакцияларини юзага келишини олдини олади.

Препаратдаги ксилитол ва сорбитол тишлар кариесини чақирмайди. Дентинокс Гель Н консервантлар ва қанд сақламайди.

Фармакокинетикаси

Болаларда тишни ёриб чиқишида, оғиз бўшлиғида маҳаллий қўллаш учун препаратдир. Шунинг учун фармакокинетик маълумотларни тақдим этиш мажбурий эмас.

Қўлланилиши

- биринчи тишлар ва барча сут тишлари, шу жумладан кечки илдизли тишларни ёриб чиқишида оғриқни қисқа вақт енгиллаштириш учун

Милкларни қизариши ва яллиғланиши кучайганда, шунингдек бошқа шикоятлар бўлганда, шифокорга мурожаат этиш керак.

Қўллаш усули ва дозалари

Нўхат катталигидаги Дентинокс гели томчиси милкнинг шикастланган соҳасига тоза бармоқ ёки тоза пахтали таёқча ёрдамида суртилади ва енгил ишқаланади.

Дентиноксни суткада 2-3 марта, айниқса овқатдан кейин ва уйқудан олдин суртиш керак.

Ножўя таъсирлари

- аллергия реакциялар кузатилиши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

- мойчечакка, лидокаинга ёки шунга ўхшаш маҳаллий анестетикларга (амид типдаги), шунингдек Дентинокс Гель Н нинг ёрдамчи моддаларидан биронтасига юқори сезувчанликда қўллаш мумкин эмас.

Сорбит сақлаганлиги туфайли, гелни кам учрайдиган наслий фруктозани ўзлаштираолмаслиги бўлган пациентларда қўллаш мумкин эмас (ҳар бир грамм гел 25 мг фруктозага камида 0,01 (НБ) эквивалент сорбит сақлайди). Энергетик қиймати 2,6 кГ/дккал/г сорбит)

Дориларнинг ўзаро таъсири

Номаълум.

Махсус курсатмалар

Кўзларга тушишига йўл қўйилмасин.

Ҳомиладорлик ва лактация даври

Ҳомиладорлик ва эмизиш давридаги аёлларда қўллаш ҳақидаги маълумот йўқ.

Дори воситасини транспорт воситалари ёки потенциал хавфли механизмларни бошқариш қобилиятига таъсирининг ўзига хослиги

Номаълум, чунки ушбу препарат фақатгина болалар учун мўлжалланган.

Дозани ошириб юборилиши

Алоҳида таъсир этувчи моддаларнинг дозасини пастлиги туфайли, дозани ошириб юборилишининг биронта ҳолати кузатилмаган.

Чиқарилиш шакли

10 г гел ички томондан алюмин қопламали, мембранали ва бураладиган ПЭНД қопқоқли тубаларда.

1 тубадан давлат ва рус тилларидаги тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан картон қутига жойланади.

Сақлаш шароити

25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати

5 йил.

Туба очилгандан кейин 1 йил.

Яроқлилик муддати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи

Дентинокс Общество фармацевтических препаратов Ленк & Шуппан
Нунсдофер Ринг, 19, 12277 Берлин, Германия

Қайд этиш гувоҳномасининг эгаси

Дентинокс Общество фармацевтических препаратов Ленк & Шуппан
Нунсдофер Ринг, 19, 12277 Берлин, Германия

Ўзбекистон Республикаси худудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили

Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент ш., а/қ 4218-сонли, Асосий почтамт.

Тел.: +99897 1575566

E-mail: vaytsirina@gmail.com