

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ДЕНТИНОКС ГЕЛЬ Н

Торговое название препарата: Дентинокс Гель Н

Лекарственная форма: гель

Состав:

1 г препарата содержит:

активные вещества:

ромашки цветков настойки (1:5) 150.0 мг;

лидокаина гидрохлорид 3.4 мг;

макрогола лауриловый эфир (полидоканола (600)) 3.2 мг;

вспомогательные вещества: карбомер, натрия эдетат, левоментол, натрия гидроксид 10% раствор, полисорбат 20, пропиленгликоль, натрия сахарин, сорбитол жидкий некристаллизирующийся, вода очищенная, ксилит.

Описание: прозрачный гель желтого цвета с характерным запахом ромашки и ментола, и со вкусом ромашки и ментола.

Фармакотерапевтическая группа: Пищеварительный тракт и обмен веществ. Стоматологические препараты. Препараты для местного лечения заболеваний полости рта другие. Прочие.

Код АТХ: А01АD11

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат Дентинокс Гель Н для кратковременного облегчения боли при прорезывании первых зубов и всего молочного прикуса.

Представляет собой гель (гидрогель) для местного применения в полости рта. На слизистой оболочке обеспечивает безболезненное и неосложненное появление первых резцов, молочных зубов и последующих коренных зубов.

Комбинация трех действующих составляющих позволяет получить длительный фармакологический эффект. Лидокаин обеспечивает быстрый обезболивающий, но кратковременный эффект, который наступает через несколько минут после аппликации препарата на десну. Длительность обезболивающего действия препарата обеспечивается полидоканолом 600.

Умеренное противовоспалительное действие настойки ромашки предупреждает возникновение местных воспалительных реакций.

Содержащиеся в препарате ксилитол и сорбитол не вызывают кариес зубов. Дентинокс Гель Н не содержит консервантов и сахара.

Фармакокинетика

Препарат для устранения боли у детей при прорезывании зубов, для местного применения в полости рта. В связи с этим, представление фармакокинетических данных считается необязательным.

Показания к применению

- для кратковременного облегчения боли при прорезывании первых зубов и всего молочного прикуса, включая появляющиеся позднее коренные зубы

При усиливающемся покраснении и воспалении десен, а также при наличии других жалоб, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Каплю геля Дентинокс, величиной с горошину нанести на пораженную область десны чистым пальцем или чистой ватной палочкой и легко втереть.

Дентинокс следует наносить 2-3 раза в сутки, особенно после еды и перед сном.

Побочные действия

- аллергические реакции

Противопоказания

- повышенная чувствительность к ромашке, лидокаину или аналогичным местным анестетикам (амидного типа), также к одному из вспомогательных веществ Дентинокс Гель Н.

С учетом содержания сорбита гель нельзя применять у пациентов с редкой врожденной непереносимостью фруктозы (в каждом грамме геля содержится сорбит, эквивалентный 25 мг фруктозы не менее 0,01 (ХЕ). Энергетическая ценность 2,6 кГ/дккал /г сорбита)

Лекарственные взаимодействия

Не установлены

Особые указания

Не допускать контакта с глазами.

Беременность и лактация

Информация о применении у женщин в период беременности и грудного вскармливания отсутствует

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Неизвестно, поскольку данный препарат предназначен исключительно для детей.

Передозировка

В связи с низкой дозой отдельных действующих веществ не отмечено ни одного случая передозировки.

Форма выпуска

По 10 г геля в тубы алюминиевые с внутренним лаковым покрытием с мембраной и завинчивающейся крышкой из ПЭНД.

По 1 тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет

Период применения после вскрытия тубы 1 год.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

Дентинокс Общество фармацевтических препаратов
Ленк & Шуппан
Нунсдофер Ринг 19, 12277 Берлин, Германия

Держатель регистрационного удостоверения

Дентинокс Общество фармацевтических препаратов
Ленк & Шуппан, Нунсдофер Ринг 19,
12277 Берлин, Германия

Наименование и местонахождение (почтовый адрес) организации, принимающей на территории Республики Узбекистан, претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей

Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, а/я 4218, Главное почтовое отделение.
e-mail: vaytsirina@gmail.com; Телефон: +99897 1575566