



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПОСТЕРИЗАН®

Торговое название препарата: Постеризан®

Лекарственная форма: мазь для ректального применения

Состав:

1 г мази содержит:

активные вещества: стандартизированная суспензия культуры бактерий (СКБ) (содержащая $3,3 \times 10^8 E.coli$ инактивированных и законсервированных с макс.3,3 мг фенола жидкого) 166,70 мг;

вспомогательные вещества: ланолин, парафин мягкий (вазелин).

Описание: однородная мазь от белого до бежевого цвета с характерным запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа: средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.

Код ATХ: C05AX

Фармакологические свойства

Активный ингредиент Постеризана – суспензия культуры инактивированных бактерий кишечной палочки (СКБ *E.coli*)

Фармакодинамика

При нанесении на кожу и слизистую оболочку СКБ *E.coli* стимулирует специфические и неспецифические иммунные механизмы.

Стимулирует Т-систему иммунитета, увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы, ряда гуморальных факторов неспецифического иммунитета. Повышает образование антител в месте воздействия и местную резистентность тканей к воздействию патогенной микрофлоры за счет содержания концентрированных полисахаридов клеточных оболочек и метаболитов кишечных палочек различных штаммов, в том числе устойчивых к антибиотикам и другим антибактериальным средствам. Уменьшает экссудацию, нормализует проницаемость и тонус кровеносных сосудов, стимулирует регенерацию поврежденных тканей.

Фармакокинетика

После ректального применения СКБ *E.coli* быстро впитывается в слизистую оболочку кишки. Исследование степени абсорбции, уровня СКБ *E.coli* и его выведения из организма при местном применении препарата провести невозможно. Однако проникновение иммуногенных ингредиентов СКБ *E.coli* было установлено иммуногистологическими исследованиями на слизистой оболочке прямой кишки лабораторных животных.

Показания к применению

- анальный зуд, выделения и жжение в анальной области вследствие геморроя
- анальные трещины, экзема

Способ применения и дозы

Мазь наносят тонким слоем на пораженный участок кожи и слизистой оболочки утром и вечером, а также после каждой дефекации. Для более глубокого введения мази в прямую кишку можно использовать навинчивающийся аппликатор, прилагаемый к комплекту.

Возможно комбинированное использование мази и суппозиториев.

После купирования симптомов заболевания лечение продолжают в течение 2-3 недель для стабилизации эффекта и профилактики рецидивов.

Побочные действия

Редко

- аллергические реакции на коже (например, к консерванту фенолу)

Противопоказания

- гиперчувствительность к одному из компонентов препарата

Лекарственные взаимодействия

Не описаны

Особые указания

Беременность и лактация

Возможно применение у беременных, а также в период лактации.

Применение в педиатрии

Эффективность и безопасность Постеризан® для детей однозначно не определены. Компоненты стандартизированной суспензии культуры бактерий (СКБ *E.coli*) не предоставляют потенциальной опасности для детей.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством и потенциально опасными механизмами

Не оказывает влияния

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

При случайном пероральном приеме (детьми) может возникнуть боль в животе, тошнота.

В случае передозировки – симптоматическое лечение.

Форма выпуска и упаковка

По 25 г препарата помещают в алюминиевые тюбики с внутренним лаковым покрытием с резьбовым колпачком из белого полиэтилена.

По одному тюбiku вместе с аппликатором из белого полиэтилена, снабженным боковыми отверстиями и инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках, помещают в коробку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

3 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Др. Каде Фармацевтическая фабрика ГмбХ,
Ригиштрассе, 2, 12277 Берлин, Германия

Наименование и страна владельца регистрационного удостоверения
Др. Каде Фармацевтическая фабрика ГмбХ, Берлин, Германия

Наименование и местонахождение (почтовый адрес) организации, принимающей на территории Республики Узбекистан, претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей

Уполномоченный представитель в РУз - Вайц Ирина Валерьевна. Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, а/я 4218, Главное почтовое отделение. e-mail: vaytsirina@gmail.com; Телефон: +99897 1575566