



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МАЗЬ ТИОТРИАЗОЛИНА

**Торговое название препарата:** Мазь Тиотриазолина  
**Действующее вещество (МНН):** тиотриазолин/thiotriazolin  
**Лекарственная форма:** мазь

**Состав:**

1 г мази содержит:

*активное вещество:* тиотриазолин (в пересчете на 100% вещество) 20 мг;

*вспомогательные вещества:* метилцеллюлоза, глицерин, метилпарагидроксibenзоат (Е 218), пропилпарагидроксibenзоат (Е 216), вода очищенная.

**Описание:** мазь бесцветная или слегка сероватого цвета. Допускается опалесценция.

**Фармакотерапевтическая группа:** средство для лечения ран и язвенных поражений.

**Код АТХ:** D03AX

### Фармакологические свойства

Фармакотерапевтическое действие тиотриазолина обусловлено мембраностабилизирующими свойствами, торможением процессов перекисного окисления липидов и активацией ферментов антирадикальной защиты в поврежденных тканях кожи и слизистых оболочек, что ведет к торможению развития травматического воспаления, увеличению интенсивности и скорости репаративных процессов, уменьшению сроков заживления ран.

### Фармакокинетика

Тиотриазолин практически не всасывается при аппликации на коже и не поступает в системный кровоток.

Препарат достаточно быстро всасывается слизистыми ротовой полости, и его максимальная концентрация в плазме крови регистрируется через 1,5 часа.

### Показания к применению

Длительно заживающие, медленно гранулирующиеся и эпителизирующиеся раны, трофические язвы и пролежни. Псориаз. Дистрофические воспалительные формы пародонтита и язвенные поражения слизистой ротовой полости и десен.

### Способ применения и дозы

Применять наружно. Мазь наносить на поверхность раны кожи тонким слоем под повязку или открытым способом 1-2 раза в сутки в течение 1-3 недель.

При стоматологических воспалительных заболеваниях мазь вводить в десенные карманы 1-2 раза в сутки в течение 1-2 недель.

### Побочные действия

Возможны реакции гиперчувствительности, включая зуд, сыпь, гиперемия кожи, лихорадка, крапивница, ангионевротический отек.

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Лекарственные взаимодействия**

Тиотриазолин можно применять с другими противовоспалительными, антисептическими и химиотерапевтическими средствами.

**Особые указания**

Препарат применять после хирургической обработки раны, удаления некротизированных тканей и обработки поверхности раны антисептиком.

*Применение в период беременности или кормления грудью.*

Противопоказаний нет.

*Дети.*

Противопоказаний нет.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.*

Не влияет.

**Передозировка**

Передозировка маловероятна.

**Форма выпуска**

По 25 г мази в тубах № 1; в пачке из картона.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Название и местонахождение производителя**

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.

**Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:**

ООО «Sarat healthcare and marketing»,

Почтовый адрес: 100017, г.Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. А.Кадырий, дом 39

Тел.: 71 234-77-06.